

DESCRIÇÃO DAS COMORBIDADES INCLUÍDAS COMO PRIORITÁRIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19

O **Plano Estadual de Vacinação** já contempla 22 categorias definidas pelo Ministério da Saúde de problemas crônicos de saúde, que garantem lugar à frente na fila como diabetes, complicações cardíacas, pulmonares ou obesidade mórbida, entre outros. Recentemente, grávidas e puérperas (que deram à luz há menos de 45 dias) foram acrescentadas a esse grupo prioritário, mesmo que não apresentem quaisquer dos comprometimentos de saúde listados.

Para comprovar o direito às doses, o governo estadual recomenda aos municípios exigir documentos como laudo médico, exames e prescrição, ou utilizar um eventual cadastro do paciente nas unidades de saúde para o fornecimento do Atestado para vacinação contra a COVID -19 em anexo.

O município que já contemplou todos aqueles com 60 anos ou mais e já poderá passar à fase seguinte. O Ministério da Saúde dividiu o cronograma do próximo grupo de beneficiados em duas fases. Na primeira, serão contemplados os seguintes casos:

- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos.
- Pacientes de doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos.
- Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) com alguma comorbidade, maiores de 18 anos.
- Pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades.
- Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Como comprovar a comorbidade?

A mais recente atualização do **Plano Estadual de Vacinação** incluiu uma orientação aos municípios, responsáveis por aplicar as vacinas, para que exijam “documento que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.)”. O Cosems destaca a importância de apresentar laudo assinado por médico atestando a condição. Mas também poderão ser utilizados "cadastros já existentes dentro das Unidades de Saúde”, quando a pessoa já é atendida e acompanhada pela rede pública.

Diabetes: (CID E.10.14)

Enquadra todas as pessoas com diabetes mellitus.

Pneumopatias crônicas graves: (CID J.40-44)

Inclui os indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática).

Hipertensão Arterial Resistente (HAR): (CID I.11-15)

Quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou pressão arterial controlada com uso de quatro ou mais anti-hipertensivos.

Hipertensão arterial estágio 3: (CID I.11-15)

Pressão arterial sistólica igual ou maior a 180 e/ou diastólica igual ou superior a 110, independentemente da presença de lesão em órgão-alvo (cérebro, coração, vasos sanguíneos, olhos, rins) ou comorbidade.

Hipertensão arterial estágios 1 e 2: com LOA e / ou Comorbidade (CID I.11-15)

Indivíduos com lesão em órgão-alvo (cérebro, coração, vasos sanguíneos, olhos, rins) e/ou comorbidade. Pressão sistólica entre 140 e 179 e/ou diastólica entre 90 e 109 na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

Insuficiência cardíaca: (CID I.20-28)

Pessoas portadoras de Insuficiência com fração de ejeção reduzida (capacidade de bombeamento do coração) reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independentemente de classe funcional da New York Heart Association.

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar: (CID I.20-28)

Pacientes com diagnóstico cor-pulmonale crônico (problema no ventrículo direito que resulta em distúrbio pulmonar), hipertensão pulmonar primária ou secundária.

Cardiopatía hipertensiva: (CID I. 20-28)

Pessoas portadoras de hipertrofia ventricular esquerda ou dilataço, sobrecarga atrial e ventricular, disfunço diastlica e/ou sistlica, leses em outros rgos-alvo (crebro, coraço, vasos sanguneos, olhos, rins).

Sndromes coronarianas: (CID I. 20-28)

Pacientes diagnosticados com sndromes crnicas como Angina Pectoris (estreitamento das artrias que levam sangue ao coraço) estvel, cardiopatía isqumica, ps-infarto agudo do miocrdio, entre outras.

Valvopatias: (CID I. 34 – 50)

Portadores de leses de vlvula cardica com repercusso na circulaço do sangue, sintomtica ou com comprometimento miocrdico.

Miocardiopatias e pericardiopatias: (CID I. 34 – 50)

Portadores de quaisquer causas ou fentipos; pericardite crnica; cardiopatía reumtica.

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fstulas arteriovenosas: (CID I.34 - 50)

Pessoas com diagnsticos de aneurismas, dissecçes, hematomas da aorta e demais grandes vasos.

Arritmias cardicas: (CID I. 34 – 50)

Pacientes diagnosticados com arritmias cardicas com importncia clnica e/ou cardiopatía associada (fibrilaço e flutter atriais; e outras).

Cardiopatía congnita no adulto: (CID I. 34 – 50)

Portadores de cardiopatias congnitas com repercusso na circulaço do sangue, crises hipoxmicas (pouco oxigenaço), insuficincia cardica, arritmias, comprometimento miocrdico.

Prteses valvares e dispositivos cardicos implantados: (CID I. 34 – 50)

Pessoas portadoras de prteses de vlvula biolgicas ou mecnicas; dispositivos cardicos implantados (marcapasso, cardiodesfibrilador, ressinronizador, assistncia circulatria de mdia ou longa permanncia).

Doença cerebrovascular: (CID G. 45 / I. 60 / 69)

Pacientes com ocorrência de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.

Doença renal crônica: (CID N.18)

Pessoas com diagnóstico de doença Renal Crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/ min/ 1,73 m²) e Síndrome Nefrética.

Imunossuprimidos: (CID Z.94 / B.20 – 24 / M.32 / E. 24 / C. 00 97)

Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente superior a 10 mg ao dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; neoplasias hematológicas.

Hemoglobinopatias graves: (CID D.50)

Pessoas com diagnóstico de anemia falciforme e talassemia maior.

Obesidade mórbida: (CID E 66.8)

Pessoas cujo índice de massa corpórea (IMC) igual ou superior a 40.

Síndrome de down: (CID Q.90)

Pacientes com diagnóstico de trissomia do cromossomo 21.

Pessoas com deficiência Permanente cadastradas no Programa de benefício de prestação continuada. (BPC)

Pessoas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade de andar, indivíduos com incapacidade de ouvir mesmo com aparelho auditivo, indivíduos com incapacidade para enxergar mesmo com uso de óculos de grau, indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite suas atividades habituais como impossibilidade de ir para escola e trabalhar.

Cirrose Hepática: (CID K.74)

Paciente com confirmação de Cirrose Hepática Child – Pugh A, B ou C.

Em ___ / ___ / 2021.

ATESTADO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Atesto para fins de vacinação contra COVID-19 que o (a) paciente _____

_____ tem indicação de vacinação* por ser portador da comorbidade abaixo descrita:

- () Diabetes mellitus
- () Pneumopatias crônicas graves (DPOC, fibrose cística e pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática)
- () Hipertensão Arterial Resistente (HAR) (acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos)
- () Hipertensão arterial estágio 3/ Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade (PAS \geq 180 e/ou PAD \geq 110 / PAS entre 140 e 179 e/ou PAD entre 90 e 109 COM LOA ou Comorbidade)
- () Obesidade mórbida IMC \geq 40
- () Síndrome de Down
- () Cirrose hepática (Child Pugh A, B ou C)
- () Anemia falciforme
- () Doença renal crônica (TFG 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossuppressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas)
- () Doenças Cardiovasculares (Insuficiência cardíaca, Cor pulmonale, Hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva, Angina estável, Cardiopatia isquêmica, IAM prévio, Lesão valvar com repercussão hemodinâmica, Portadores de próteses valvares, Miocardiopatias, Pericardiopatias, cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, Fibrilação, Flutter atrial, Aneurismas e Dissecções de aorta e grandes vasos, AVC, AIT, Demência vascular.)
- () Deficiência física permanente (Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas / Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo / Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos / Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.)

Nome Completo do Médico/ CRM Carimbo